

AUSSTATTUNG EINES NOTFALLKOFFERS

Die angeführten *Arzneien werden als Inhaltsstoffe angegeben* und stellen den Bedarf für alle zu erwartenden - auch protrahierten - Reanimationsfälle dar.
Bei Bedarf kann die Ausstattung durch ordinationsspezifische Hilfsmittel bzw. Medikamentezusätzlich ergänzt werden.

I) Medikamente in alphabetischer Reihenfolge:

- 5 Amp. Atropin sulfat (Atropin 0,5 mg)
- 2 Amp. Midazolam (Dormicum 5 mg/1 ml (Psychotropenverordnung beachten)
- 2 Amp. Urapidil hydrochlorid (Ebrantil 25 mg)
- 2 Amp. Theophyllin (Theospirex 200 mg)
- 2 Amp. Furosemid natrium (Furon zu 40 mg (Lasix))
- 2 Amp. Esketamin hydrochlorid (Ketanest 25mg/ml)
- 1 Fl. 100ml Natriumbicarbonat _nach Astrup und BE _ -6
- 2 Dstfl. Vecuronium bromid (Norcuron zu 10mg) derzeit kein adäquater Ersatz vorhanden
- 3 Amp. Propofol /(Diprivan 1%)
- 3 Amp. Amiodaron hydrochlorid (Sedacoron 150mg)
- 2 Amp. Prednisolon (Solu - Dacortin zu 250 mg)
- 5 Amp Epinephrin (L-Adrenalin spritzfertig 2mg/20ml)
- 1 Amp. Diphenhydramin HCl (Dibondrin)

II) Medikamente-sonstige, in alphabetischer Reihenfolge:

- 1 Nitroglycerin-Spray
- 1 Salbutamol sulfat (Sultanol-Dosieraerosol)

III) Infusionen:

Menge je nach Platz; Mindestanzahl ist aber 1 Stück pro 500 ml-Einheit / in Plastikbeuteln,

da einfacher zu lagern

- 1 x 500 ml kristalloide Lsg. (Ringer-Lsg., Ringer-Laktat o.ä.)
- 1 x 500 ml physiol. NaCl (Natrium chlorid Baxter 0,9% (Plastikbeutel))
- 1 x 100 ml Fl. physiol. NaCl
- 5 x 10 ml physiol. NaCl Plastikampullen

IV) Zum Beatmen und Intubieren:

- 1 Beatmungsbeutel ev. Einmalprodukt
- 1 Beatmungsfilter (Sterivent) entfällt bei 1x Beatmungsbeutel

Beatmungsmasken Größe 3, 4, 5 (Einmalprodukt)
Larynxmaske I-gel® 3, 4, 5
Larynxtubus LTS-D® 3 4 5
Laryngoskop (Funktionsüberprüfung!)
Spatel gebogen, Größe 3, 4,
Spatel gerade, Größe 3
je 1 Tubus der Größe 6, 7, 8
1 Führungsdraht
1 Magillzange
oropharyngeale Airways der Größe 3, 4, 5
nasopharyngeale Airways der Größe 26, 28, 30
Absaugkatheter Ch 14 und 16, je 2 Stück

V) Zugänge:

Venflon: blau, rosa, grün, weiß (grau) (mind. 2 Stück pro Größe)
1 Stauschlauch
Leukosilk o.ä. (1 x breit, 1 x schmal),
Venflonbefestigungen (ev. Peha-Haft zum Venflon fixieren)
ausreichend 2ml, 5ml, 10 ml, und 20 ml Spritzen
ca. 10 rote Verschlussstöpserl (in kleiner Schachtel)
3 Dreiweghähne (ev. Dreiweghähne mit Verlängerung)
3 Infusionsbestecke
3 Entnahmekanülen
genügend i.v., i.m. und s.c.-Nadeln

VI) Diverses:

unsterile (vorzugsweise latexfreie) Handschuhe, medium und large
sterile Tupfer
fertige Desinfektionsmittel Tupfer
1 Schere
2 Einmalklemmen
1 kleine Rolle Peha - Haft
Stethoskop und Blutdruckmesser