## Impfungen für Personal des Gesundheitswesens

Medizinische Personengruppen und Impfindikation nach Impfung und Bereichen

Berufsgruppen	COVID-19 <sup>1</sup> , DiTetPert-Polio <sup>2</sup> , Hep. B, Influenza, MMR <sup>3</sup> , Pneumokokken <sup>4</sup> , Varizellen <sup>3</sup>	Spezielle Empfehlungen	
		Hep. A	Meningokokken (ACWY und B)
Ärztinnen, Ärzte, Zahnärztinnen, Zahnärzte	+++	++4	+++5
Gesundheits- und Krankenpflegeberufe, Ordinationsassistenz, Hebammen, zahnärztliche Assistenz, Hilfspersonal im Gesundheits- und Pflegebereich, Optometrie, Orthoptik	+++	++6	+++5
Rettungs- und Krankentransportdienste	+++	++	+++
Therapeutisches Personal (Logopädie, Ergo-, Physiotherapie, Radiologie-Technologie, Röntgenassistenz)	+++	+	+++5
Nicht medizinische Patientendienste (Heimhilfen, Friseurinnen und Friseure, Pediküre u.a. und nicht gesetzlich geregelte Gesundheitsberufe)	+++	-	-
Psychotherapie, klinische Psychologie	+++	-	-
Sozial- und Fürsorgepersonal (im Spitals- und Pflegebereich)	+++	-	-
Laborpersonal, biomedizinische Analytik, Laborassistenz	+++	++ (bei Stuhlverarbeitung)	+++ <sup>7</sup>
Reinigungspersonal	+++	+	-
Servicepersonal im med. Bereich	+++	-	-
Orthopädietechnik	+++	-	-
Apothekerinnen, Apotheker	+++	-	-

<sup>+++</sup> hohes Risiko, Impfung dringend erforderlich; ++ intermediäres Risiko, Impfung wird angeraten; + geringes Risiko, Impfung dennoch überlegenswert

Details zu einzelnen Empfehlungen siehe Impfplan Österreich 2021 unter <u>www.sozialministerium.at/impfplan</u> bzw. COVID-19 Anwendungsempfehlung unter <u>www.sozialministerium.at/corona-schutzimpfung-fachinformationen</u>

Irrtümer, Druck- und Satzfehler vorbehalten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Details siehe "COVID-19-Impfungen: Priorisierung des Nationalen Impfgremiums" und "COVID-19-Impfungen: Anwendungsempfehlungen des Nationalen Impfgremiums" unter www.sozialministerium.at/corona-schutzimpfung-fachinformationen

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Regelmäßige Auffrischungsimpfungen gegen Polio bei medizinischem Personal, mit möglicher PV-Exposition (Erkrankte, Labor)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In Hochrisikobereichen (Onkologie, Neonatologie, Patientinnen und Patienten mit schwerer Immunsuppression etc.) Titerkontrolle für Masern, Röteln und Varizellen.

<sup>4</sup> Pneumokokken ab dem vollendenden 50. Lebensjahr nach individueller Prüfung bzw. ab dem vollendeten 60. Lebensjahr und für Risikogruppen laut allgemeiner Empfehlung, siehe Kapitel Pneumokokken des Impfplan Österreich 2021

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ausgenommen Zahnärztinnen und Zahnärzte

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Wenn in Pädiatrie, Infektionsabteilung, ICU oder Labor tätig: auf Grund der Schwere der Erkrankung auch bei geringem Ansteckungsrisiko empfohlen

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ausgenommen zahnärztliche Assistenz und Optometrie

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Nur in Laboratorien, die Proben von Patientinnen und Patienten mit Meningokokkeninfektionen untersuchen