Anzeige gemäß § 2 Abs. 1 des Epidemiegesetzes 1950	Anlage I
Patient*in (Name, Vorname)	☐ Verdacht auf Erkrankung (nicht alle klinischen Kriterien* müssen erfüllt sein)
Geschlecht:  weiblich  männlich divers Geburtsdatum:	☐ Erkrankung (klinische Kriterien* erfüllt und Laborbestätigung liegt vor) Erkrankungsdatum: Diagnosedatum:
Sozialversicherungsnummer:	
Adresse: Telefonnummer:	□ Tod Todesdatum:
☐ Amöbenruhr¹	□ Ausscheider*in □ Norovirus-Infektion, lebensmittelbedingt¹
Anthrax/Milzbrand¹ Aviäre Influenza/ Vogelgrippe (A/H5N1-Infektion)¹ Botulismus¹ Brucellose² Campylobacteriose¹ Chikungunya-Fieber² Cholera¹ Clostridioides difficile-Infektion, schwere Verlaufsform² Dengue-Fieber² Dengue-Fieber, schwere Verlaufsform Diphtherie² Respiratorische Diphtherie Hautdiphtherie Echinokokkose durch Fuchsbandwurm¹ Echinokokkose durch Hundebandwurm¹ Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)² Gelbfieber¹ Invasive Haemophilus influenzae-Erkrankung² Bejiglotitis Meningitis	Paratyphus¹ Pertussis/ Keuchhusten² Pest¹ Pocken¹ Poliomyelitis/ Kinderlähmung¹ Invasive Pneumokokken-Erkrankung² Bakteriämische Pneumonie Meningitis Meningitis UND Sepsis Sepsis Andere Psittakose¹ Puerperalfieber¹ Rickettsiose durch <i>R. prowazekii</i> ¹ Röteln² Röteln² Rötelnembryopathie² Rotavirus-Infektion, lebensmittelbedingt¹ Rückfallfieber² Salmonellose¹ SARS/ schweres akutes respiratorisches Syndrom¹
Meningitis   Meningitis UND Sepsis   Osteomyelitis/septische Arthritis   Pneumonie   Sepsis     Hämorrhagisches Fieber, viral¹; Erreger:   Hanta-Virus-Infektion²   Hepatitis A-Virus Infektion¹   Hepatitis B-Virus Infektion¹   Hepatitis C-Virus Infektion¹   Hepatitis D-Virus Infektion¹   Hepatitis E-Virus Infektion¹   Lebensmittelbedingte Intoxikation   S.aureus   B. cereus   C. perfringens¹   Legionärskrankheit²   Lepra¹   Leptospirose¹   Listeriose¹   Malaria²   Masern¹ Exanthem-Beginn:   Invasive Meningitis UND Sepsis   Pneumonie   Sepsis OHNE Meningitis   Mensoritis UND Sepsis   Pneumonie   Sepsis OHNE Meningitis   Andere   MERS-CoV Infektion¹	SARS/ schweres akutes respiratorisches Syndrom¹  SARS-CoV-2-Infektion¹
geimpft, aber Intervall überzogen Anzahl erhaltener Impfdosen: Datum der letzten Impfung: Impfstoff (Produktname): Impfstoff (Produktname): Patient*in ist in medizinischen Einrichtungen tätig Patient*in ist in Lebensmittel verarbeitenden Einrichtungen tätig	
☐ Patient*in ist in einer Gemeinschaftseinrichtung tätig, z.B. Kindergarten, Schule, Pflegeheim, sonstige Massenunterkünfte ☐ Patient*in wird in einer Gemeinschaftseinrichtung/gesundheitsversorgender Einrichtung betreut ☐ Auslandsaufenthalt Reiseland: Aufenthaltsperiode: von bis	
Meldende Person (Ärztin/Arzt, Praxis, Krankenanstalt, Adresse, Telefonnummer): Meldedatum: An die Bezirksverwaltungsbehörde-Gesundheitsamt:	
	<b>3 3</b>

### Amöbenruhr

Intestinale Amöbose: Mindestens eines der folgenden Symptome: (blutig-schleimiger) Durchfall; Entzündung des Dickdarms Extraintestinale Amöbose (Amöbenleberabszess): Mindestens eines der folgenden Symptome: Schmerzen im rechten Oberbauch; extraintestinale Abszesse (pathologische Leberparenchymveränderungen)

# Anthrax/Milzbrand

Hautmilzbrand, Gastrointestinalmilzbrand, Lungenmilzbrand, Meningitis/Meningoenzephalitis-Milzbrand, Septikämischer Milzbrand

Aviäre Influenza/Vogelgrippe Mindestens eines der folgenden Symptome: Fieber UND Anzeichen und Symptome einer akuten Atemwegsinfektion; Tod durch unerklärliche akute Atemwegserkrankung

### Botulismus

Lebensmittel- und Wundbotulismus; Mindestens einer der beiden Symptome: beidseitige Schädigung der Hirnnerven (z.B. Diplopie, verschwommene Sicht, Dysphagie, bulbäre Schwäche); periphere symmetrische Lähmung

Botulismus bei Kleinkindern: Jedes Kleinkind mit mindestens einem der folgenden Symptome: Verstopfung; Lethargie; Stillprobleme; Ptosis; Dysphagie; allgemeine Muskelschwäche

### Brucellose

Fieber UND mindestens eines der folgenden Symptome: Schweißausbrüche (profus, übelriechend, vor allem nachts); Schüttelfrost; Arthralgie; Schwächegefühl; Depression; Kopfschmerzen; Anorexie

# Campylobacteriose

Mindestens eines der folgenden Symptome: Durchfall; Bauchschmerzen; Fieber

# Chikungunya-Fieber

Akuter Fieberbeginn >38,5°C UND schwere Arthralgie, die nicht durch eine andere Krankheit erklärt werden kann

### Cholera

Mindestens eines der folgenden Symptome: Durchfall; Erbrechen

## Clostridioides difficile-Infektion (CDI), schwere Verlaufsform Mindestens eines der drei folgenden Kriterien:

Aufnahme/Verlegung auf eine Intensivstation aufgrund einer CDI oder ihrer Komplikationen; Durchführung eines chirurgischen Eingriffs (z.B. Kolektomie) aufgrund eines Megakolons,
Darmperforation od. Therapie-refraktären Kolitis; Tod innerhalb von
10 Tagen nach Diagnosestellung einer CDI und Wertung der CDI als
direkte Todesursache oder als zum Tode beitragende Erkrankung

# Dengue-Fieber

Eine der 3 klinischen Manifestationen: Fieber (Denguefieber); schwere Verlaufsform: Fieber UND hämorrhagische Verlaufsform (hämorrhagisches Denguefieber); Fieber UND hämorrhagische Verlaufsform UND Herz-/Kreislaufversagen (Dengue-Schock-Syndrom)

# Diphtherie

Mindestens eine der folgenden klinischen Manifestationen: Klassische respiratorische Diphtherie: Erkrankung der oberen Atemwege mit Laryngitis/Nasopharyngitis/Tonsillitis UND eine adhärente Membran/Pseudomembran;

Milde respiratorische Diphtherie: Erkrankung der oberen Atemwege mit Laryngitis/Nasopharyngitis/Tonsillitis <u>ohne</u> adhärente Membran/Pseudomembran;

Hautdiphtherie: Hautläsion;

Sonstige Diphtherie: Läsion der Augenbindehaut oder der

## Echinokokkose/Hundebandwurm/Fuchsbandwurm Klinische Kriterien für Überwachungszwecke irrelevant

## Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) Symptome eines entzündeten ZNS, z.B. Meningitis;

Meningoenzephalitis; Enzephalomyelitis; Enzephaloradikulitis

Fieber UND mindestens einer der beiden folgenden Symptome: Gelbsucht, generalisierte Blutungen

# Invasive Haemophilus influenzae-Erkrankung

Hämorrhagisches Fieber, viral (Ebola, Krim-Kongo-, Marburg-, Lassa-Fieber und andere):

Gegenwärtig od. vor dem Ableben folgende Symptome: Fieber ≥ Segenward of von der Nobern logende Symptome: Freder a 38,6°C UND zumindest eines der folgenden Symptome: Starke Kopfschmerzen; Pharyngitis; Erbrechen; Durchfall; Bauchschmerzen; Blutungen; Multi-Organversagen ODER plötzlicher und unerklärlicher Tod

# Hanta-Virus-Infektion

Mindestens eines der folgenden klinischen Manifestationen:

(1) hämorrhagische Verlaufsform (*Hämorrhagisches Fieber mit renalem Syndrom* (HFRS));
(3) Nierenfunktionsstörung;
(4) mindestens zwei der folgenden Symptome: Durchfall; Dyspnoe;

Herz-/Kreislaufversagen; (Hantavirus-induziertes kardio-pulmonales Syndrom (HCPS)); Husten; Lungeninfiltrate (Hantavirus-induziertes pulmonales Syndrom (HPS); Kopfschmerzen; Muskel-, Glieder- oder Rückenschmerzen; neu aufgetretene Myopie ("Verschwommensehen"); Übelkeit oder Erbrechen

Hepatitis, akut – gilt für HAV-, HBV-, HCV-, HDV-, HEV-Infektion Symptome wie Müdigkeit; Bauchschmerzen; Appetitverlust; zeitweilige Übelkeit und Erbrechen) UND mindestens eines der

folgenden Symptome: Fieber; Gelbsucht; erhöhte Serum-Aminotransferase-Aktivität

Hepatitis, chronisch - gilt für HBV-, HCV-, HDV-Infektion Klinische Kriterien für Überwachungszwecke irrelevant

# Legionärskrankheit

Radiologische / klinische Pneumonie

### Lepra

Mindestens eine der vier folgenden klinischen Manifestationen: Indeterminierte Lepra: Einzelne, hypopigmentierte, makulöse (fleckige) Hautläsionen

<u>Tuberkuloide Lepra:</u> Vorliegen der beiden folgenden Symptome: einzelne, abgegrenzte, hypopigmentierte, am Rande papulös erhabene, sensibilitätsgestörte Hautareale; verdickte periphere

Lepromatöse Lepra: Definiert als Vorliegen einer der beiden folgenden Symptome: zahlreiche beidseitig, symmetrisch angeordnete makulopapulöse (fleckig-erhabene) Läsionen der Haut oder Schleimhaut der oberen Atemwege; knotig-flächenhafte Hautinfiltrationen

Borderline Lepra: Mindestens je eines der Symptome der tuberkuloiden und lepromatösen Form

# Leptospirose

Fieber ODER mindestens zwei der folgenden Symptome: Schüttelfrost; Kopfschmerzen; Myalgie; Bindehautsuffusion; Hautund Schleimhauteinblutungen; Exanthem; Gelbsucht; Myokarditis; Meningitis; Nierenfunktionsstörung; Hämoptysen

# Listeriose

Mindestens eines der folgenden Symptome: Fieber; Meningitis oder Meningoenzephalitis oder Enzephalitis; grippeähnliche Symptome; Sepsis; lokalisierte Infektionen wie Arthritis, Endokarditis Endophthalmitis, Abszesse

Listeriose in der Schwangerschaft: Spontanabort; Fehlgeburt;
Totgeburt (fötaler Tod nach 20. SSW); Frühgeburt (vor 37. SSW)
Neugeborenen-Listeriose: mindestens eines der folgenden
Symptome im ersten Lebensmonat: Meningitis oder Meningoenzephalitis; Sepsis; Dyspnoe; Granulomatosis infantiseptica; Haut-, Schleimhaut- oder Bindehautläsionen

### Malaria

Fieber ODER Fieber in der Anamnese

Fieber UND makulopapulöses Exanthem UND mindestens eines der folgenden Symptome: Husten, Schnupfen, Konjunktivitis

# Invasive Meningokokken-Erkrankung

## MERS-CoV Infektion

Akutes respiratorisches Syndrom (mit oder ohne Fieber, mit oder ohne Husten), bei dem basierend auf klinischen, radiologischen od. histopathologischen Hinweisen auf ein entzündliches Infiltrat der Verdacht besteht, dass die unteren Atemwege betroffen sind (z.B. Pneumonie oder akutes Atemnotsyndrom)

Norovirus-Infektion, lebensmittelbedingt Mindestens eines der folgenden Symptome: Durchfall; Erbrechen

# Pertussis/Keuchhusten

Mindestens zwei Wochen anhaltender Husten UND mindestens eines der folgenden Symptome: Hustenanfälle; Keuchen beim Einatmen; posttussives Erbrechen ODER ärztliche Keuchhusten-Diagnose ODER Apnoe-Episoden bei Kleinkindern

Mindestens einer der folgenden klinischen Manifestationen: Beulenpest: Fieber UND plötzliches Auftreten schmerzhafter Lymphadenitis;

Pestsepsis: Fieber

<u>Lungenpest</u>: Fieber UND mindestens eines der folgenden Symptome: Husten; Brustschmerzen; Hämoptysen

# Invasive Pneumokokken-Erkrankung

# Pocken

Fieber UND Bläschen oder feste Pusteln im gleichen Entwicklungsstadium mit zentrifugaler Verteilung ODER Fieber UND atypisches Erscheinungsbild (mindestens eines der folgenden Symptome: hämorrhagische Läsionen; flache samtige Läsionen, die nicht zu Bläschen fortschreiten; Variola sine eruptione; milderer Typ)

Poliomyelitis/Kinderlähmung Akute schlaffe Parese < 15a ODER sonstiger Polioverdacht

# Psittakose

Mindestens eines der folgenden Kriterien: Pneumonie; Endo- oder Myokarditis oder mindestens zwei der fünf folgenden Symptome: Fieber, Hepatosplenomegalie, Hepatitiszeichen, Husten, Kopfschmerzen

# Rickettsiose

Fieber

Plötzliches Auftreten eines generalisierten makulopapulösen Exanthems UND mindestens einer der folgenden Symptome: zervikale Adenopathie; subokzipitale Adenopathie; postaurikulare Adenopathie; Arthralgie; Arthritis

# Rötelnembryopathie (CRS)

Jedes Kleinkind unter 1a oder jedes Totgeborene mit mindestens zwei der unter Kategorie A angeführten Befunde ODER einem Befund der Kategorie A und einem der Kategorie B: <u>Kategorie A</u>: Katarakt(e); angeborenes Glaukom; angeborene Herzkrankheit; Gehörverlust; Retinopathia pigmentosa <u>Kategorie B</u>: Purpura; Splenomegalie; Mikrozephalie; Entwicklungsverzögerung; Meningoenzephalitis; Atrophie der

Knochen mit vermehrter Strahlendurchlässigkeit; Gelbsucht innerhalb von 24 Stunden nach der Geburt

# Rotavirus-Infektion, lebensmittelbedingt

Mindestens eines der folgenden Symptome: Durchfall; Erbrechen

Mindestens eines der folgenden Symptome: Appetitlosigkeit; Fieber mit Schüttelfrost; Myalgien/Athralgien in Kopf und Brust; Nasensekretion; Lichtempfindlichkeit

# Rückfallfieber

Fieber

# Salmonellose

Mindestens eines der folgenden Symptome: Durchfall; Fieber; Bauchschmerzen; Erbrechen

Akutes Fieber oder Fieber in der Anamnese UND mindestens eines der folgenden Symptome: Husten; Atembeschwerden; Kurzatmigkeit UND mindestens einem der folgenden Befunde: radiologischer Pneumonie-Nachweis; radiologischer Nachweis des akuten respiratorischen Distress-Syndroms; Autopsiebefund Pneumonie; Autopsiebefund des akuten respiratorischen Distress-Syndroms UND Fehlen einer alternativen Diagnose

# SARS-CoV2-Infektion

Klinischer Verdacht: Jede Form einer akuten respiratorischen Infektion (mit oder ohne Fieber) mit mind. einem der folgenden Symptome, für das es keine andere plausible Ursache gibt: Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, plötzlicher Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes

### Scharlach

Mindestens eines der folgenden Symptome: Pharyngitis; Impetigo/Pyodermie; Wundinfektion; septisches Krankheitsbild UND feinfleckiges Exanthem (makulopapulös) UND mindestens eines der folgenden Symptome: fleckiges Exanthem am weichen Gaumen; Himbeer- oder Erdbeerzunge; Abschuppen der Haut bei Abheilung des Exanthems unter Betonung der palmoplantaren Bereiche

Mindestens eines der folgenden Symptome: Durchfall; Fieber; Erbrechen; Bauchschmerzen

# STEC/VTEC-Infektion

Mindestens eines der folgenden Symptome: Durchfall; Bauchschmerzen. HUS: akutes Nierenversagen UND mikroangiopathische hämolytische Anämie und/oder Thrombozytopenie

# Tollwut/Wutkrankheit

Akute Enzephalomyelitis UND mindestens zwei der folgenden Symptome: sensorische Veränderungen im Zusammenhang mit einem Tierbiss an der Bissstelle; Parese oder Paralyse; Krämpfe der Schluckmuskeln; Hydrophobie; Delirium; Krämpfe; Angstzustände

# Trachom/ägyptische Körnerkrankheit

Klinische Zeichen einer follikulären Konjunktivitis (Akutphase), Entropium und Trichiasis (Spätstadium)

Transmissible spongiforme Enzephalopathien, human sCJD, gCJD, erworbene CJD

# Trichinose/Trichinellose

Mindestens drei der folgenden Symptome: Fieber; Muskelschmerzen; Durchfall; Gesichtsödem; Eosinophilie, subkonjunktivale, subunguale und retinale Blutungen

# Tularämie

Mindestens eine der folgenden klinischen Manifestationen: <u>Ulceroglanduläre Tularämie</u>: kutaner Ulkus UND regionale Lymphadenopathie

Glanduläre Tularämie: vergrößerte und schmerzhafte Lymphknoten ohne erkennbaren Ulkus

Okuloglanduläre Tularämie: Konjunktivitis UND regionale

Oropharyngeale Tularämie: zervikale Lymphadenopathie UND mind. einer der folgenden Befunde: Stomatitis; Pharyngitis; Tonsillitis Intestinale Tularämie: mindestens eines der folgenden Symptome: Bauchschmerzen; Erbrechen; Durchfall

Pulmonäre Tularämie: Pneumonie Typhoidale Tularämie: mind. eines der folgenden Symptome: Fieber ohne frühe Lokalisierungsanzeichen und -symptome; Sepsis

# Typhus/Paratyphus

Anhaltendes Fieber ODER mindestens zwei der folgenden Symptome: Kopfschmerzen; relative Bradykardie; Husten ohne Auswurf; Durchfall; Verstopfung; Unwohlsein oder Bauchschmerzen

# West-Nil-Fieber

Mindestens eines der folgenden Symptome: Fieber, Enzephalitis, Meningitis. Bei asymptomatischer Infektion klinische Kriterien

Mindestens eines der folgenden Symptome: Fieber; Durchfall; Erbrechen; Bauchschmerzen (Pseudoappendizitis); Stuhlzwang

# 7ika-Virus-Infektion

Hautausschlag UND eines der folgenden Symptome: Fieber, makulopapulöser Hautausschlag, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Konjunktivitis, GBS

# Angeborene Zika-Virus-Infektion

Mikrozephalie, intrazerebrale Verkalkungen, sonstige Störungen des ZNS bei Föten oder Neugeborenen