

Ergeht an:

Wiener Krankenanstaltenverbund  
Alle privaten bettenführenden Krankenanstalten  
Ärztchammer für Wien  
Rettungsorganisationen  
Blutspendezentrale des Roten Kreuzes  
Reisemedizinische Zentren  
VIC Medical Service IAEA  
Landespolizeidirektion Wien

**Magistrat der Stadt Wien**  
**Magistratsabteilung 15 -**  
**Gesundheitsdienst der Stadt Wien**  
**Projektleitung Covid-19**

Thomas-Klestil-Platz 8/2,  
2. Stock, Top 14.212, TownTown  
1030 Wien

Telefon +43 1 4000 87122

Fax +43 1 4000 99 87122

[leitung.covid19@ma15.wien.gv.at](mailto:leitung.covid19@ma15.wien.gv.at)  
[www.gesundheitsdienst.wien.at](http://www.gesundheitsdienst.wien.at)

Per E-Mail

Zu MA 15 – 75324-2020

Wien, 11.02.2021

**Neuartiges Coronavirus (SARS-CoV-2, früher 2019-nCoV),  
10. Update (Änderungen grün)**

Sehr geehrte Damen und Herren!

Inzwischen sind in Wien Stand 11.2.2021 / 00:00 Uhr 85.114 Erkrankungsfälle (+392 zum Vortag) und 1.585 Todesfälle aufgetreten. Die 7-Tages-Inzidenz beträgt 97,8/100.000. Anhand von PCR Voranalysen und ersten Sequenzierungsergebnissen ist von einer Verbreitung der Virusvariante B.1.1.7 (UK-Mutante) in Wien von rund 40% auszugehen.

Die bundesgesetzlichen Vorgaben zu den Maßnahmen - aktuell geregelt in der 4. COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung - und die Einreisebestimmungen werden laufend angepasst<sup>i</sup>. Für die Einreise aus den meisten Ländern gilt mit wenigen Ausnahmen eine 10-tägig Quarantäne, die frühestens durch einen nach 5 Tagen durchgeführten Antigen- oder PCR-Test mit negativem Ergebnis beendet werden kann. **Ab 10.2.2021 müssen auch PendlerInnen ein negatives Testergebnis vorweisen, das nicht älter als 7 Tage sein darf.**

**Die Empfehlung für medizinisches Personal zum neuartigen Coronavirus (2019-nCoV)**

siehe auch Homepage des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK)<sup>ii</sup>

Verdachtsfälle einer möglichen Erkrankung durch SARS-CoV-2 sollten rasch abgeklärt werden:

**Aktuelle Falldefinition eines Verdachtsfalls an SARS-CoV-2 (Stand 23.12.2020 - Beilage)**

- Jede Person, die die klinischen Kriterien erfüllt, d.h. jede Person mit mindestens einem der folgenden Symptome: Husten, Fieber, Kurzatmigkeit, plötzliches Auftreten einer Störung bzw. Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns.

**Wahrscheinlicher Fall:**

- Jede Person, die symptomatisch ist und Kontaktperson I oder II ist (klinische und epidemiologische Kriterien erfüllt) ODER
- Jede Person, die radiologische Hinweise auf COVID-19 kompatible Läsionen aufweist (diagnostisches Bildgebungskriterium erfüllt) ODER
- **Jede Person mit Nachweis von SARS-CoV-2 spezifischem Antigen ohne weitere Hinweise**

### **Bestätigter Fall: Jede Person auf die Folgendes zutrifft**

- Nachweis von SARS-CoV-2 spezifischer Nukleinsäure (PCR-Test), unabhängig von Symptomen ODER
- Nachweis von SARS-CoV-2 spezifischem Antigen (Antigen-Schnelltest) UND symptomatisch (klinische Kriterien erfüllt) ODER
- Nachweis von SARS-CoV-2 spezifischem Antigen UND Kontaktperson I oder II (epidemiologische Kriterien erfüllt).<sup>iii</sup>

Wahrscheinliche Fälle mit pos. Antigen-Test sind mittels PCR-Test zu bestätigen.

Auch bei bestätigten Fällen mit pos. Antigen-Test ist im Hinblick auf die Virus-Mutanten **nach wie vor eine PCR-Testung anzustreben**, speziell bei Reiseanamnese oder rascher Verbreitung.

### **Aktuelle Prioritätensetzung bei der Testung auf SARS-CoV-2:**

- 1) Verdachtsfälle **und wahrscheinliche Fälle** (siehe oben)
- 2) Kategorie 1-Kontakte zu bestätigten Fällen, insbesondere auch beim Personal in Krankenanstalten, sowie in Alten- Wohn-, Betreuungs-, u. Pflegeeinrichtungen.
- 3) Kategorie 2-Kontakte zu bestätigten Fällen beim Personal in Krankenanstalten sowie Alten- Wohn-, Betreuungs- u. Pflegeeinrichtungen **und generell bei Nachweis von Virus-Mutanten mit höherem Übertragungspotential**
- 4) Screening-Tests des Personals (gemäß der 4. COVID-19 Schutzmaßnahmenverordnung) In Krankenanstalten und **Behinderteneinrichtungen wöchentlich, in Alten-Wohn- und Pflegeheime alle 3 Tage.**
- 5) Personen vor Aufnahme in Alten- Wohn-, Betreuungs- u. Pflegeeinrichtungen sowie vor Übernahme in die mobile Pflege und Betreuung sowie PatientInnen vor Aufnahme in Krankenanstalten für elektive Eingriffe (Ausnahmen sind bei ambulanter Behandlung möglich, wenn für Patient und Personal Maskenschutz sichergestellt ist).

Im Fall von Erkrankungsfällen in Institutionen ist immer ein breites Umfeld-Screening vorgesehen, um unentdeckte Fallketten zu unterbinden (Bitte immer Fremdpersonal bedenken).

Siehe dazu auch die aktuelle Österreichische Teststrategie SARS-COV-2 vom 13.10.2020.<sup>iv</sup>

### **Testungen** auf SARS-CoV-2 entsprechend dieser Prioritätensetzung erfolgen **mittels PCR** über:

- Anruf von symptomatischen PatientInnen bei **1450** bzw.
- Eigene Testschienen für MitarbeiterInnen in der jeweiligen Organisationseinheit (z.B. Krankenhaus, Ärztekundendienst für in Wien niedergelassene ÄrztInnen und Ordinationspersonal über +43 1 51501-1500)

Zusätzlich stehen 2 **Teststraßen** zur Verfügung, wo Probenabnahmen für PCR-Tests durchgeführt werden <https://coronavirus.wien.gv.at/site/testangebote/><sup>v</sup>:

- 1) Teststraße beim Ernst-Happel-Stadion:
  - für Personen ohne Symptome (Reiserückkehrer und Kontaktpersonen)
- 2) Teststraße auf der Donauinsel – Floridsdorfer Brücke:
  - für Personen ohne oder mit leichten Symptomen (Schwerpunkt: leicht Erkrankte)

Darüber hinaus werden PCR-Untersuchungen in einer Vielzahl an Laboren kostenpflichtig angeboten<sup>vi</sup>.

Untersuchungen mittels **Antigen- Schnelltest** werden **für symptomatische Personen** in den **Checkboxes**, die vom Ärztekundendienst gemeinsam mit der Stadt Wien für die lokale Bevölkerung betrieben werden, angeboten (mit anschließender Probennahme für PCR, wenn pos.), aber auch in den Drive Ins beim Austria Center Vienna und beim Schloss Schönbrunn.<sup>vii</sup>

Zusätzlich spielen Testungen von großen Bevölkerungsgruppen zur Infektionskontrolle eine immer größere Bedeutung. Verpflichtend sind diese aktuell für Bildungspersonal, ArbeitnehmerInnen und Verwaltungspersonal mit direktem KundInnenkontakt, ArbeitnehmerInnen im Bereich der Lagerlogistik, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, und Personen, die körpernahe Dienstleistungen in Anspruch nehmen (4. COVID-19 Schutzmaßnahmenverordnung).

**Antigen-Schnelltests für symptomlose Personen** (mit anschließender Probennahme für PCR, wenn pos.) werden in Wien in den **Teststraßen** Ernst-Happel-Stadion (Walk In), Austria Center Vienna, Stadthalle, Schloss Schönbrunn und Schule Erlaaer Schleife angeboten.

Ab 8.2.2020 werden Antigen-Schnelltests für symptomlose Personen zusätzlich auch in spezialisierten Apotheken kostenlos angeboten<sup>viii</sup>.

Auch in Betrieben und in medizinischen und Pflege-Einrichtungen werden – wie oben erwähnt - Tests durch dafür berechtigtes Personal durchgeführt. Für die Bestätigung von derartigen Tests wurde vom BMSGPK ein Formblatt zur Verfügung gestellt (Beilage).

In den Bildungseinrichtungen gibt es für das Bildungspersonal PCR-Untersuchungen mittels Gurgulat mit anerkannten Befunden.

Selbsttests mit anteronasalem Nasenabstrich werden nicht als Zutrittstest anerkannt.

#### **Empfohlene Hygienemaßnahmen:**

Siehe die Empfehlungen des RKI<sup>ix</sup>, <sup>x</sup>. bzw. der WHO<sup>xi</sup> und des ECDC<sup>xii</sup>.

#### **Kontaktpersonennachverfolgung** (Stand: 27.1.2021 - Beilage):

Zu **Kategorie I Kontakten** (KP1) gehören u.a.:

- Personen, die ungeschützten, direkten physischen Kontakt mit einem COVID-19-Fall hatten
- Personen, die kumulativ für 15 Minuten oder länger in einer Entfernung  $\leq 2$  Meter Kontakt von Angesicht zu Angesicht mit einem COVID-19-Fall hatten (insbesondere Haushaltskontakte)
- Personen, die sich im selben Raum (z.B. Klassenzimmer, Besprechungsraum, Warteraum einer Gesundheitseinrichtung) mit einem COVID-19-Fall in einer Entfernung  $\leq 2$  Meter für 15 Minuten oder länger aufgehalten haben - Ausnahmeregelungen für Kontakte in Bildungseinrichtungen bis zur 5. Schulstufe, wenn der Indexfall ein Kind dieser Altersgruppe ist.
- Personen, die unabhängig von der Entfernung mit hoher Wahrscheinlichkeit einer relevanten Konzentration von Aerosolen ausgesetzt waren (z.B. Feiern, gemeinsames Singen oder Sporttreiben in Innenräumen) oder ungeschützten, direkten Kontakt mit infektiösen Sekreten eines bestätigten Falles hatten.
- Gesundheits- und Pflegepersonal, das ungeschützten Kontakt hatte

Diese enthält auch eine Tabelle unter welchen Schutzvorkehrungen in welchen Situationen Gesundheit- und Pflegepersonal als geschützt gilt. Wird keine Schutzausrüstung verwendet oder sind die Schutzmaßnahmen geringer als angeführt, wird je nach Situation gemäß dem Management von Kontaktperson der Kategorie I oder Kategorie II vorgegangen.

Die Absonderungsdauer für Haushaltsmitglieder, die als Kategorie I-Kontakt gegenüber dem im gleichen Haushalt isolierten COVID-19-Falls nicht die notwendigen Infektions-Schutzmaßnahmen („Information für Kontaktpersonen“<sup>xiii</sup>) einhalten können, beträgt 14 Tage ab Symptombeginn des COVID-19-Falls unabhängig vom Auftreten weiterer Fälle im gleichen Haushalt. Bei Absonderungsmöglichkeit gelten 10 Tage Absonderung ab dem letzten Kontakt.

Personen, die die Erkrankung durchgemacht haben, werden für **6 Monate** trotz KP1-Kontakt als Kontaktperson Kategorie 2 eingestuft

Für Kontaktpersonen zu einer Person, die mit einem mutierten Virus infiziert ist, gilt Folgendes:

- KP1 sollen sofort und nochmals vor Beendigung der Absonderung (ab Tag 5) getestet werden (– je nach Kapazitäten gilt das auch für andere KP1)
- Haushaltsmitglieder von KP 1 müssen außerhalb des Wohnbereichs FFP2- Schutzmaske tragen
- KP2: Testung ab Tag 5 nach dem letzten infektiösen Kontakt

Für Geimpfte gelten dieselben Vorgaben wie für andere Kontaktpersonen, aufgrund fehlender Daten über die Auswirkung der Impfung auf die Übertragung.

Für **versorgungskritisches Gesundheits- und Schlüsselpersonal** ist ein **Weiterarbeiten** trotz Kategorie I-Kontakt mit einem COVID-19-Fall oder mit einer SARS-CoV-2 infizierten Person möglich (aktuelle Vorgabe vom 12.11.2020), solange die Person für **10** Tage nach dem Kontakt:

- keine Symptome einer akuten respiratorischen Infektion aufweist (Selbstbeobachtung: 2xtgl. dokumentiert)
- der Immunstatus bei Dienstbeginn SARS-CoV-2 negativ ist: Nachweis durch PCR-Test bei Probenabnahme nicht mehr als 24 h vor Dienstantritt oder aktueller Antigentest (nach einem ersten neg. PCR-Test)
- eine dem Arbeitsplatz und der Situation angemessenen persönlichen Schutzausrüstung getragen wird und verstärkte sorgfältige Handhygiene durchgeführt wird (Schutzmaskentragepflicht während der gesamten Dienstverrichtung, kein Besuch der Kantine etc.)

Im Privatleben gelten weiterhin Verkehrsbeschränkungen; bei täglicher Testung ist die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel am Weg von und zur Arbeit unter Verwendung einer FFP2-Maske ohne Ventil zulässig.

Analoge Schlüsselpersonalregelungen gibt es für Spitzensportler und Künstler in Bezug auf Training/Proben und Wettkämpfe/Auftritte.

Die aktuelle **Empfehlung zur Entlassung aus Krankenanstalten und aus der häuslichen Isolation** sieht Folgendes vor:

- Nach leichtem Krankheitsverlauf (ohne Sauerstoffbedürftigkeit) kann die häusliche Absonderung nach **10 Tagen** ohne weitere Nasen-Rachen-Abstriche aufgehoben werden, sofern bereits seit 48 Stunden Symptombefreiheit besteht.
- Bei symptomatischen Personen mit schwerem Krankheitsverlauf (mit Sauerstoffbedürftigkeit) muss vor Beendigung der Absonderung zusätzlich eine negative SARS-CoV2-PCR-Untersuchung oder (bei pos. PCR) ein **Ct-Wert > 30** vorliegen.
- Bei BewohnerInnen von Betreuungseinrichtungen (Altersheim, Pflegeheim, etc.) wird **bei schwerer Erkrankung oder Vorliegen von Mutanten** vor der endgültigen Entlassung aus der Absonderung auch zusätzlich eine negative PCR-Untersuchung oder (bei pos. PCR) ein Ct-Wert > 30 gefordert.
- Für die Aufnahme der Tätigkeit als medizinisches oder pflegerisches Fachpersonal ist zusätzlich eine neg. PCR-Untersuchung oder - bei noch pos. PCR - ein Ct-Wert > 30 nötig.
- Asymptomatische Personen: Beendigung der Absonderung frühestens 10 Tage nach dem positiven Testergebnis.
- Asymptomatische Personen, die bei einer PCR-Screening-/Monitoring-Untersuchung ohne Bezug zu einer Fall- oder Ausbruchsabklärung positiv auf SARS-CoV-2 getestet werden, sind bei Symptombefreiheit und
  - durchgeführter Umgebungsabklärung mit neg. Ergebnis (zumindest neg. PCR-Test Ergebnis aller Kategorie-1-Kontaktpersonen) und
  - einem Ct-Wert von >30 und

- einem Ct-Wert von >30 oder einem negativen Testergebnis bei einer weiteren Folge-PCR-Testung nach mindestens 48 Stunden (zusätzlich gegebenenfalls Nachweis von IgG-Antikörpern im ELISA/CLIA-Test)  
nach derzeitiger Erfahrung als Personen mit bereits durchgemachter Erkrankung anzusehen.

Die **COVID-19-Impfungen** in Wien finden seit Ende Dezember 2020 beginnend mit den Pflegeheimen statt. Die Impfkoordination erfolgt über eigene Impfkoordinatoren der jeweiligen Bereiche in Abstimmung mit dem Impfmanagement der MA15 sowie der Impfkoordinatorin der Stadt Wien. Zentrale Anfragen können an [cov19.impfung@ma15.wien.gv.at](mailto:cov19.impfung@ma15.wien.gv.at) gesendet werden.

Fachliche Informationen des nationalen Impfgremiums finden Sie unter <https://www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Fachinformationen.html> („COVID-19 Impfungen: Priorisierung des nationalen Impfgremiums“ und COVID-19-Impfungen: „Anwendungsempfehlungen des Nationalen Impfgremiums“

Eine allgemeine **Impfvormerkung** für Wien ist unter <https://impfservice.wien> möglich. Dort kann man sich durch Auswählen einer der Kategorien vormerken, wodurch Sie unter Einhaltung der Priorisierung des nationalen Impfgremiums und nach Verfügbarkeit des Impfstoffes ehestmöglich kontaktiert werden, sobald ein Impftermin zur Verfügung steht.

Die laufend aktualisierten wissenschaftlichen Erkenntnisse und Informationen entnehmen Sie bitte weiterhin der Internetseite des BMSGPK.

Für allgemeine Fragen wurde eine bundesweite **Coronavirus Hotline eingerichtet**, an der Expertinnen und Experten der AGES Fragen rund um das neuartige Corona-Virus beantworten. Telefon: **0800 555 621**, die rund um die Uhr erreichbar ist.

Die Stadt Wien stellt auch für die Allgemeinbevölkerung im Internet Informationen zur Verfügung: <https://www.wien.gv.at/gesundheit/coronavirus.html>.

An die Meldepflicht für das 2019-nCoV („2019 neuartiges Coronavirus“), jetzt SARS-CoV-2 bei Verdachtsfällen, Erkrankungs- und Todesfall nach dem Epidemiegesetz wird erinnert. **Meldungen über positive Antigen-Tests bei symptomatischen Personen und Kontaktpersonen (laut Falldefinition bestätigter Fall) sollen mittels Arztmeldungen (Beilage) oder mittels angeschlossenen Formular durch andere zur Durchführung berechnigte Stellen (Beilage) an [antigentest-einmeldung@ma15.wien.gv.at](mailto:antigentest-einmeldung@ma15.wien.gv.at) gesendet werden. Geben Sie dabei unbedingt an, ob die gemeldete Person symptomatisch und/oder eine Kontaktperson ist. Die Veranlassung eines PCR-Tests wird aufgrund des Auftretens der Virus-Mutanten empfohlen.**

Es wird ersucht diese Information in Ihrem Wirkungsbereich bekannt zu machen.

Mit freundlichen Grüßen

Für den Abteilungsleiter:

6 Beilagen



OPhysR Dr. Ursula Karthaler

- 
- <sup>i</sup> <https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Rechtliches.html>
- <sup>ii</sup> <https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Uebertragbare-Krankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/Neuartiges-Coronavirus.html>:
- <sup>iii</sup> <https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Fachinformationen.html>
- <sup>iv</sup> <https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Fachinformationen.html>
- <sup>v</sup> <https://coronavirus.wien.gv.at/site/testangebote/>
- <sup>vi</sup> <https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ--Testungen-und-Quarantaene.html> (Welche Labore bieten Testungen an?)
- <sup>vii</sup> <https://coronavirus.wien.gv.at/site/checkboxen/>
- <sup>viii</sup> <https://www.apoapp.co.at/wp-content/uploads/covid-19-antigentests-apothekenliste.pdf>
- <sup>ix</sup> [https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges\\_Coronavirus/Hygiene.html](https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html)
- <sup>x</sup> [https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges\\_Coronavirus/Ressourcen\\_schonen\\_Masken.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Ressourcen_schonen_Masken.pdf?__blob=publicationFile)
- <sup>xi</sup> <https://www.who.int/health-topics/coronavirus> (technical guidance)
- <sup>xii</sup> <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-guidance-wearing-and-removing-personal-protective-equipment-healthcare-settings-updated.pdf>; [https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Infection-prevention-and-control-in-healthcare-settings-COVID-19\\_4th\\_update.pdf](https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Infection-prevention-and-control-in-healthcare-settings-COVID-19_4th_update.pdf)
- <sup>xiii</sup> <https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ--Testungen-und-Quarantaene.html> Ich hatte Kontakt ....
- 

## Empfohlene Hygienemaßnahmen analog dem Vorgehen bei SARS und MERS CoV:

---

- von anderen Patienten getrennte Unterbringung
  - sofortige Versorgung von Verdachtsfällen mit einer **FFP2-Maske, sofern toleriert, sonst** Mund-Nasenschutz und Unterbringung in einem eigenen Raum/Einzelzimmer (möglichst mit eigener Nasszelle)
  - Betreuung wahrscheinlicher oder bestätigter Fälle in einem Einzelzimmer mit Schleuse. Raumluftechnische Anlagen, über die eine Verbreitung von Luft auf andere Räume möglich ist, sollten gegebenenfalls abgestellt werden
- Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung für das betreuende Personal:
  - Atemschutzmaske (bei unerwartetem Auftreten von Verdachtsfällen zumindest ein mehrlagiger Mund-Nasenschutz, bei Betreuung von wahrscheinlichen Fälle oder bestätigten Fällen dicht anliegende FFP2 bzw. FFP3-Maske – jedenfalls bei aerosolproduzierenden Maßnahmen),
  - Schutzkittel und Einmalhandschuhe;
  - geeignete Schutzbrille und Schutzhaube bei face-to-face Kontakt und Arbeiten direkt am Patienten.
- die Patientin/der Patient wird außerhalb des Isolierbereichs (Transport) mit einer **FFP2-Schutzmaske** (ohne Ventil) versorgt
- hygienische Händedesinfektion mit einem Desinfektionsmittel mit nachgewiesener mindestens begrenzt viruzider Wirksamkeit vor und nach Patientenkontakt, nach Ablegen der Handschuhe, nach dem Abnehmen der Maske sowie auch nach Kontakt mit möglicherweise kontaminierten Oberflächen
- abschließende Schlusdesinfektion von kontaminierten Flächen und medizinischen Geräten (wie z.B. Stethoskopen) unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten
- ungeschützte Kontaktpersonen sollen namentlich mit Daten zur Erreichbarkeit erfasst werden. Betreuendes medizinisches Personal soll auch bei Verwendung von Schutzausrüstung zwecks Nachbeobachtung dokumentiert werden.