

23. Oktober 2025

Befristete Bereitstellung von gratis Trumenba mit Mindesthaltbarkeitsdatum 31. Dezember 2025 zur Bestellung im e-Impfshop der BBG

Seitens Bund stehen einmalig in Summe 7.000 Dosen des Meningokokken-B-Impfstoffes Trumenba (Verfallsdatum 31. Dezember 2025) aus einer Überbeschaffung zur kostenlosen Verteilung zur Verfügung und können – solange der Vorrat reicht – über den [e-Impfshop](#) der BBG für kostenfrei bestellt werden.

Die Auslieferung kann gemeinsam mit anderen im e-Impfshop bestellbaren Impfstoffen (z.B. Influenza) erfolgen, sodass insgesamt eine Mindestbestellmenge von 18 Dosen für alle Impfstoffe weiterhin besteht. Die **Maximalbestellmenge pro Bestellung** für Trumenba beträgt **100 Dosen**.

Informationen zur Abrechnung

- Impfstoffkosten für diese Trumenba-Impfstoffe dürfen zu impfenden Personen nicht in Rechnung gestellt werden, da es sich um Impfstoffe handelt, die seitens Bund kostenfrei bereitgestellt werden.
- Für die Verabreichung dieser Meningokokken B-Impfungen können keine Impf honorare bereitgestellt werden, diese wären erforderlichenfalls vor Ort zwischen impfender Einrichtung und zu impfenden Personen zu regeln.
- Die Impfstoffe sollten direkt in impfende Einrichtungen bestellt werden. Sollte eine Zustellung über Apotheken benötigt werden, so wären allfällig anfallende Distributionskosten der Apotheke ebenfalls zwischen Apotheke und impfender Einrichtung zu regeln.

Informationen zur Zulassung und Anwendung

- Trumenba ist ab dem Alter von zehn Jahren zugelassen.
- Es sind zwei Dosen im Abstand von sechs Monaten empfohlen – **Achtung: 2. Dosis nach sechs Monaten steht in diesem Rahmen nicht kostenlos bereit**; bei spezieller Indikation Auffrischung alle fünf Jahre.
- Trumenba und Bexsero sind während der Grundimmunisierung und auch bei Auffrischungsimpfungen nicht austauschbar. Weitere Impfungen sollten mit demselben Impfstoff erfolgen, Details siehe Fachinformation und aktueller [Impfplan Österreich](#).
- Die Impfung gegen Meningokokken B ist bis zum vollendeten 25. Lebensjahr empfohlen, sowie für Personen mit spezieller Indikation, darunter Personen mit erhöhtem Erkrankungsrisiko, beispielsweise immunsupprimierte oder Personen mit Immundefekten oder Asplenie sowie für Personen mit erhöhtem Expositionsrisiko, wie Personal von Pädiatrien, Infektionsabteilungen, Intensivstationen, Rettungs- und Krankentransportdienste etc.