

5. Februar 2026

## **Impfstoffverfügbarkeit und empfohlenes Impfschema für Shingrix®**

Der Gürtelrose-Impfstoff Shingrix® ist aktuell nicht bestellbar. Laut BMASGPK erfolgt die nächste Lieferung im Laufe des ersten Halbjahres 2026. Sobald uns nähere Informationen vorliegen, informieren wir selbstverständlich.

### **Empfohlenes Impfschema Shingrix®**

Bei der Gürtelrose Impfung gilt ein empfohlenes Impfintervall von mindestens zwei Monaten (zwei bis sechs Monate möglich).

Bei Impfstoff-Engpässen sollten Zweitimpfungen laut empfohlenem Intervall und Impfungen von Hochrisikopatient\*innen, welche die Impfung dringend benötigen, etwa im Vorfeld einer immunsupprimierenden Therapie etc. bevorzugt werden.

Bei Immundefizienz/Immunsuppression kann die 2. Dosis bereits ein bis zwei Monate nach der 1. Dosis verabreicht werden. Der Abstand zu weiteren (Auffrischungs-)Impfungen ist noch nicht festgelegt. Derzeit ist keine Auffrischungsimpfung empfohlen.

Wurde die zweite Dosis mit Shingrix® versäumt, so sollte die Impfung ehestmöglich nachgeholt werden, auch wenn das Intervall zur letzten Impfung um mehr als ein Jahr überzogen ist.

Weitere Details finden Sie im [Impfplan Österreich 2025/26, Seite 130 ff.](#)