

MY DRUG CHECK WARNUNG 2026 KW23

Achtung: Hoher Wirkstoffgehalt in diesen Proben!!

Diese als **Heroin** abgegebenen Proben enthielten

56,6% Diacetylmorphin, 1,9% Paracetamol und 1,5% Koffein

56,2% Diacetylmorphin, 2,6% Paracetamol und 2,0% Koffein



Diacetylmorphin ist der Hauptwirkstoff von Heroin und gehört zu den halbsynthetischen Opioiden. Es hat starke Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem und unterdrückt das Atemzentrum. Bei zu hoher Dosis kann es zu einer lebensbedrohlichen Abflachung der Atmung kommen. Die Grenze zwischen einer wirksamen und tödlichen Dosis kann sehr gering sein. Bei regelmäßigem Konsum entwickelt der Körper rasch eine Toleranz, das Suchtpotential ist daher sehr hoch.

- Nutze Drug Checking, da Aussehen nichts über Inhaltsstoffe sagt.
- Ohne Drug Checking zuerst kleine Mengen antesten und Wirkung abwarten.
- Konsumiere wenn möglich nicht allein und mach genügend Pausen.
- Bei Problemen sofort Rettung (144) rufen.
- Vermeide Mischkonsum, besonders mit zentral dämpfenden Substanzen.

MY DRUG CHECK WARNUNG 2026 KW23



Diese als Heroin abgegebenen Proben enthielten

13,9% Diacetylmorphin, 28,8% Paracetamol und 27,6% Koffein
sowie unlösliche Bestandteile!

Substanzinfo

Achtung: Hoher Wirkstoffgehalt in diesen Heroinproben sowie unlösliche Bestandteile!

Diacetylmorphin ist der Hauptwirkstoff von Heroin und gehört zu den halbsynthetischen Opioiden. Es hat starke Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem und unterdrückt das Atemzentrum. Bei zu hoher Dosis kann es zu einer lebensbedrohlichen Abflachung der Atmung kommen.

Diese Proben enthielten **unlösliche Bestandteile**, bei denen es sich vermutlich um eine eisenhaltige Verbindung handelt. Solche Partikel sind für den menschlichen Körper nicht geeignet.

Insbesondere bei intravenösem Konsum besteht ein erhebliches Risiko, da unlösliche Partikel in die Blutbahn gelangen und dort Gefäße verstopfen (Embolien), Entzündungsreaktionen auslösen oder schwere Infektionen bis hin zu Sepsis verursachen können. Zudem können sich Partikel in Organen wie der Lunge ablagern und langfristige Schäden hervorrufen.

Von einer Aufnahme, insbesondere durch intravenösen Konsum, ist daher dringend abzuraten!!

Safer use

- Nutze Drug Checking, da Aussehen nichts über Inhaltsstoffe sagt.
- Ohne Drug Checking zuerst kleine Mengen antesten und Wirkung abwarten.
- Konsumiere wenn möglich nicht allein und mach genügend Pausen.
- Bei Problemen sofort Rettung (144) rufen.
- Vermeide Mischkonsum, besonders mit zentral dämpfenden Substanzen.